



AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

REGION CHAMPAGNE-ARDENNE

BULLETIN n° 86 du 4 AOUT 1989

DLP 11-08-89 152350

POMME de TERRE : Mildiou : peu de contamination.

MAIS : Pucerons : surveiller.

BETTERAVE : Maladies : situation.

LUZERNE : Insectes : situation.

POMME de TERRE

MILDIOU

Situation :

Dans tous les secteurs, une seule contamination théorique a été enregistrée le 30 juillet. Sortie de tache prévue vers le 5-6 août.

Aucun symptôme décelé en culture.

Préconisation :

Il y a lieu de protéger à nouveau les cultures.

Un produit de contact est dans la plupart des cas suffisant.

MAIS

PUCERONS

Situation :

Le vol des pucerons est faible puisqu' on n'enregistre à la tour à succion de Lavannes que quelques captures.

Captures totales enregistrées ces 4 dernières semaines :

- 2e semaine de juillet = 3471.
- 3e semaine de juillet = 1226.
- 4e semaine de juillet = 247.
- 1ère semaine d'août = 28.

Dans les cultures de maïs, quelques colonies sont observées.


Préconisation :

Surveiller les parcelles, en particulier celles traitées il y a environ 3 semaines avec un anti-pyrrole liquide.

Ministère de l'Agriculture
Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt
Service Régional de la Protection des Végétaux
62, avenue Nationale - La Neuville
B.P. 1154 - 51056 REIMS CEDEX
Téléphone : 26.09.06.43

786

Publication périodique ABONNEMENT ANNUEL : 190F



BETTERAVES

MALADIES

Situation :

L'état des cultures est, dans l'ensemble, sain. Dans certains secteurs, les betteraves commencent à souffrir du manque d'eau.

Préconisation :

Dans les parcelles où des symptômes de cercosporiose et de rouille ont été notés, prévoir un renouvellement du traitement 3 semaines après la 1ère intervention. Dans les autres parcelles, un premier traitement préventif est à réaliser dans la semaine du 7 au 13 août.

LUZERNE

INSECTES

Situation :

Poursuite du vol de sitones mais les 1ers semis (fin juin - début juillet) ne sont plus sensibles à cet insecte.

Parfois on rencontre des larves de noctuelles de couleur brun-noir au niveau du sol qui détruisent les plantules.

Préconisation :

Ne plus intervenir sur les parcelles bien développées.

Continuer à surveiller les semis plus tardifs de luzerne jusqu'à ce que les jeunes plantules atteignent 10 cm.

Le traitement contre les sitones est efficace sur les chenilles de noctuelles.

EN RAISON DES CONGES ET DU DEPART EN RETRAITE DU RESPONSABLE DU LABORATOIRE,
NOUS VOUS PRIONS DE BIEN VOULOIR NOUS CONTACTER AVANT TOUT ENVOI D'ECHANTILLONS
POUR DIAGNOSTIC.

CETTE MESURE NE CONCERNE PAS LES ANALYSES DE RESISTANCE.

VOUS VOULEZ ETRE INFORMES ENCORE PLUS RAPIDEMENT ?

ABONNEZ-VOUS à TEL-SPV